

Листок-вкладыш: информация для пользователя/пациента

СЕПТОЛЕТЕ® ТОТАЛ

ЛИМОН/БУЗИНА

3 мг/1 мг пастилки

бензидамина гидрохлорид/цетилпиридиния хлорид

Внимательно и полностью прочтите данный листок-вкладыш перед началом применения данного препарата, так как он содержит важную для Вас информацию.

- Следует всегда принимать данный препарат согласно указаниям данного листка-вкладыша или рекомендациям врача или фармацевта.
- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется его перечитать.
- При необходимости получения дополнительной информации или рекомендаций следует обратиться к фармацевту.
- При появлении любого побочного действия следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту. Учитываются также возможные побочные реакции, не указанные в данном листке-вкладыше. См. п. 4.
- Если по истечении 3 дней Ваше состояние не улучшилось или ухудшилось, следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша:

1. Что такое *Септолете тотал лимон/бузина* и для чего используется
2. Необходимая информация перед началом применения *Септолете тотал лимон/бузина*
3. Способ применения *Септолете тотал лимон/бузина*
4. Возможные побочные реакции
5. Условия хранения *Септолете тотал лимон/бузина*
6. Содержание упаковки и дополнительная информация

1. ЧТО ТАКОЕ СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЛИМОН/БУЗИНА И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Септолете тотал лимон/бузина рекомендуется в качестве местного го противовоспалительного, обезболивающего и антисептического средства для ротовой полости. *Септолете тотал лимон/бузина* дезинфицирует слизистую оболочку полости рта и глотки, уменьшает признаки воспаления горла, такие как боль, покраснение, отек, повышенная температура и нарушение местных функций.

Септолете тотал лимон/бузина рекомендуется в качестве противовоспалительного, обезболивающего и антисептического средства:

- при воспалении горла, ротовой полости и десен,
- при гингивитах, фарингитах и ларингитах.

Если по истечении 3 дней Ваше состояние не улучшилось или ухудшилось, следует обратиться к врачу.

2. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЛИМОН/БУЗИНА

Не следует принимать *Септолете тотал лимон/бузина*:

- при аллергии на бензидамина гидрохлорид, цетилпиридиния хлорид или любой другой компонент данного препарата (см. пункт 6).
- препарат не следует применять детям в возрасте до 6 лет, так как он не рекомендуется для указанной возрастной группы.

Особые указания и предостережения

Перед началом применения *Септолете тотал лимон/бузина* проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Не следует использовать *Септолете тотал лимон/бузина* на протяжении более 7 дней.

Если по истечении 3 дней лечения Ваше состояние не улучшилось или ухудшилось, или появились другие симптомы, например, лихорадка, следует обратиться к врачу.

Использование препаратов для местного применения, особенно в течение длительного времени, может привести к повышению чувствительности - в этом случае лечение следует прекратить.

Септолете тотал лимон/бузина не следует использовать одновременно с аннионными соединениями, содержащимися, например, в зубной пасте, поэтому не рекомендуется использовать препарат непосредственно перед чисткой зубов или после нее.

Дети и подростки

- препарат не следует применять детям в возрасте до 6 лет, так как он не рекомендуется для указанной возрастной группы.

Септолете тотал лимон/бузина с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или фармацевту о том, что Вы принимаете, недавно принимали или могли принимать любые другие лекарственные средства

Не следует использовать *Септолете тотал лимон/бузина* одновременно с другими антисептиками.

Септолете тотал лимон/бузина с пищей, напитками и алкоголем

Не следует принимать *Септолете тотал лимон/бузина* с молоком, так как это снижает эффективность препарата.

Не следует принимать *Септолете тотал лимон/бузина* непосредственно перед едой или во время приема пищи. Следует исключить употребление пищи и напитков в течение, по крайней мере, часа после приема *Септолете тотал лимон/бузина*.

Беременность, кормление грудью и репродуктивная функция

Если Вы беременны или кормите грудью, подозреваете о беременности или планируете беременность, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед началом применения данного препарата.

Септолете тотал лимон/бузина не рекомендуется в период беременности. При грудном вскармливании следует посоветоваться с лечащим врачом, который примет решение о целесообразности прекращения грудного вскармливания или применения *Септолете тотал лимон/бузина*.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Септолете тотал лимон/бузина не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Септолете тотал лимон/бузина содержит изомальтит (E953)

Если лечащий врач сообщил Вам о непереносимости некоторых сахаров, следует проконсультироваться с ним перед началом применения данного препарата.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЛИМОН/БУЗИНА

Всегда используйте данный препарат в строгом соответствии с рекомендациями врача или фармацевта. При возникновении сомнений следует проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.

Взрослые

Рекомендуемая доза - 3-4 пастилки в день. Пастилка должна медленно раствориться в ротовой полости, интервал между приемами составляет 3-6 часов.

Взрослые и подростки старше 12 лет

Рекомендуемая доза - 3-4 пастилки в день. Пастилка должна медленно раствориться в ротовой полости, интервал между приемами составляет 3-6 часов.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет

Рекомендуемая доза - 3 пастилки в день. Пастилка должна медленно раствориться в ротовой полости, интервал между приемами составляет 3-6 часов.

Дети в возрасте до 6 лет

Септолете тотал лимон/бузина не следует применять детям в возрасте до 6 лет

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не следует принимать *Септолете тотал лимон/бузина* непосредственно перед едой или во время приема пищи.

Следует исключить употребление пищи и напитков в течение, по крайней мере, часа после приема препарата.

Для достижения оптимального эффекта не рекомендуется использовать препарат непосредственно перед чисткой зубов или после нее.

Продолжительность лечения

Не следует использовать *Септолете тотал лимон/бузина* на протяжении более 7 дней.

Если по истечении 3 дней лечения Ваше состояние не улучшилось или ухудшилось, или появились другие симптомы, например, лихорадка, следует обратиться к врачу.

Обратитесь к врачу при рецидиве заболевания или при появлении каких-либо изменений в течении болезни.

Если Вы приняли повышенную дозу *Септолете тотал лимон/бузина*

При случайном приеме повышенной дозы данного препарата следует немедленно обратиться к врачу или ближайшую больницу.

Если Вы забыли принять *Септолете тотал лимон/бузина*

Не следует применять двойную дозу в целях компенсации пропущенной.

При возникновении дополнительных вопросов относительно данного препарата следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Как и все лекарственные средства, данный препарат может вызвать побочные реакции, хотя и не у всех.

Редкие (наблюдаются у до 1 из 1000 человек)

- реакция гиперчувствительности,
- сыпь (крапивница), повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (фотосенсибилизация),
- внезапное, неконтролируемое сужение дыхательных путей легких (бронхоспазм).

Очень редкие (наблюдаются у до 1 из 10000 человек)

- местное раздражение полости рта, ощущение жжения на участке слизистой полости рта.

С неизвестной частотой (невозможно оценить частоту по имеющимся данным)

- ощущение жжения на участке слизистой полости рта, потеря чувствительности слизистой оболочки рта (анестезия).

Как правило, указанные побочные реакции являются проходящими. Однако, при их возникновении рекомендуется обратиться к врачу или фармацевту.

При соблюдении указаний данного листка-вкладыша снижается риск возникновения побочных реакций.

Сообщение о побочных реакциях

При возникновении любых побочных реакций следует обратиться к лечащему врачу или фармацевту. Учитываются также побочные реакции, не перечисленные в данном листке-вкладыше. Также можно сообщить о побочных реакциях напрямую через национальную систему отчетности, подробная информация опубликована на сайте Агентства по лекарствам и медицинским изделиям: www.amed.md или по адресу электронной почты farmacovigilenta@amed.md.

Сообщая о побочных реакциях, Вы можете способствовать в предоставлении дополнительной информации о безопасности данного препарата.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ ЛИМОН/БУЗИНА

Следует хранить данный препарат в недоступном для детей месте. Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте. Не следует использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после EXP. Срок годности относится к последнему дню соответствующего месяца. Не следует выбрасывать лекарственные средства в канализацию или бытовые отходы. Спросите фармацевта, как поступить с препаратами, которые больше не используются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание *Септолете тотал лимон/бузина*

Активными веществами являются бензамидина гидрохлорид и цетилпиридиния хлорид.

Каждая пастилка содержит 3 мг бензамидина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридиния хлорида.

Вспомогательные вещества: масло мяты перечной, левоментол, сукралоза (E955), лимонная кислота безводная (E330), изомальтит (E 953), ароматизатор лимона, ароматизатор цветков бузины, куркумин (E100) и медный комплекс хлорофилла (E141).

Описание *Септолете тотал лимон/бузина* и содержимое упаковок

Круглые пастилки со скошенными краями и шероховатой поверхностью от светло-зеленого до зеленого цвета. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха внутри пастилки и незначительная неровность краев.

Септолете тотал лимон/бузина выпускается в пачках, содержащих 16 таблеток в блистерах (ПВХ / ПЭ / ПВДХ / Ал).

Владелец регистрационного свидетельства и производитель

Владелец регистрационного свидетельства
КРКА, д. д., Ново место Словения, 8501 Ново место,
ул. Шмарьшка цеста, 6

Производитель

КРКА, д. д., Ново место
Словения, 8501 Ново место, ул. Шмарьшка цеста, 6
TAD Pharma GmbH, Хайнц-Ломанн-Штрассе 5,
27472 Куксхафен, Германия

Данный проспект был утвержден в марте 2018 г.

Подробная информация о данном препарате опубликована на сайте Агентства по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>