

Листок-вкладыш: Информация для пользователя

Септолете® тотал

3 мг/1 мг пастилки
Бензидамина гидрохлорид/
Цетилпиридиния хлорид

Внимательно и полностью прочитайте данный листок-вкладыш перед началом применения данного лекарства, так как он содержит важную для вас информацию.

Всегда используйте данное лекарственное средство согласно указаниям, изложенным в данном листке-вкладыше, или указаниям вашего врача или фармацевта.

- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется его перечитать.
- Если вам необходимо больше сведений или рекомендаций, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
- Если у вас возникают любые побочные действия, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Они включают любые возможные побочные действия, не указанные в данном листке-вкладыше. См. п.4.
- Если через 3 дня вы не почувствовали себя лучше или вы чувствуете себя хуже, вам необходимо обратиться к врачу.

Что вы найдете в данном листке-вкладыше:

- 1.Что такое Септолететотал 3 мг/1 мг в пастилках и для чего используется.
- 2.Что вам следует знать перед применением пастилок Септолететотал 3 мг/1 мг
- 3.Как принимать пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг.
- 4.Возможные побочные действия.
- 5.Как хранить пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг.
- 6.Содержимое упаковки и другая информация.

1.Что такое Септолететотал 3 мг/1 мг в пастилках и для чего используется.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг рекомендуются для местного противовоспалительного, обезболивающего и антисептического лечения полости рта. Септолететотал дезинфицирует слизистую оболочку полости рта и горла; сокращает признаки воспаления горла, такие как боль, краснота, отечность, повышение температуры и потеря местной функции.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг рекомендуются для противовоспалительного, обезболивающего и антисептического лечения:

- воспалений горла, ротовой полости и десен;
- при гингивитах, фарингитах и ларингитах.

Если через 3 дня лечения вы не почувствовали себя лучше или вы чувствуете себя хуже, вам необходимо обратиться к врачу.

2.Что вам следует знать перед применением пастилок Септолететотал 3 мг/1 мг

Не применяйте пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг:

- если у вас аллергия на бензидамина гидрохлорид, цетилпиридиния хлорид или любой из остальных компонентов данного препарата (перечислены в п.6);
- лекарство не следует применять детям младше 6 лет, поскольку оно не рекомендуется этой возрастной группе.

Предостережения и меры предосторожности

Перед началом применения пастилок Септолететотал 3 мг/1 мг, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Не используйте пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг дольше 7 дней.

Если ваши симптомы усугубляются или не улучшаются, или если возникают другие симптомы, например, повышение температуры, обратитесь к врачу.

Использование лекарств для местного применения, особенно долгое время, может привести к сенсибилизации, в этом случае лечение следует прекратить.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг не следует применять одновременно с анионовыми соединениями, подобным тем, которые присутствуют в зубной пасте, поэтому не рекомендуется применять лекарство непосредственно перед или сразу же после чистки зубов.

Дети и подростки

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг не рекомендуются детям младше 6 лет, т.к. данное лекарство не следует применять в этой возрастной группе.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг вместе с другими лекарственными средствами

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или, возможно, будете принимать любые другие лекарства. Не применяйте пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг одновременно с другими антисептиками.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг вместе с пищей, напитками и алкоголем

Не принимайте пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг, запивая их молоком, т.к. это снижает эффективность лекарства.

Не принимайте пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг непосредственно перед или во время еды. Не принимайте пищу и не пейте как минимум час после приема пастилок Септолететотал 3 мг/1 мг.

Беременность, лактация и детородная функция

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или намерены забеременеть, то перед началом приема данного лекарства обратитесь за рекомендациями к своему врачу или фармацевту. Во время беременности и грудного вскармливания, пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг следует принимать только под наблюдением врача.

Управление транспортными средствами и использование оборудования

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг не влияют на способность к управлению транспортными средствами и использованию оборудования.

Пастилки Септолететотал 3 мг/1 мг содержат изомальт (E953)

Если ваш врач вам сказал, что у вас непереносимость некоторых углеводов, то перед применением данного лекарства проконсультируйтесь со своим врачом.

3. Как принимать таблетки Септолетотал 3 мг/1 мг

Всегда принимайте данное лекарство в строгом соответствии с указаниями вашего врача.

В случае неуверенности, проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

Взрослые

Рекомендуемая доза составляет 3-4 таблетки в сутки. Таблетку следует медленно рассасывать в полости рта, с промежутком от 3 до 6 часов.

Взрослые и подростки старше 12 лет

Рекомендуемая доза составляет 3-4 таблетки в сутки. Таблетку следует медленно рассасывать в полости рта, с промежутком от 3 до 6 часов.

Дети от 6 до 12 лет

Рекомендуемая доза составляет 3 таблетки в сутки. Таблетку следует медленно рассасывать в полости рта, с промежутком от 3 до 6 часов.

Дети младше 6 лет

Таблетки Септолетотал 3 мг/1 мг не следует применять детям младше 6 лет.

Не превышайте рекомендуемую дозу

Не принимайте таблетки Септолетотал 3 мг/1 мг непосредственно перед или во время еды. Не принимайте пищу и не пейте жидкости как минимум час после применения лекарства.

Для достижения наилучшего эффекта, не рекомендуется применять лекарство непосредственно перед или сразу же после чистки зубов.

Продолжительность лечения

Не применяйте данное лекарство дольше 7 дней. Если ваши симптомы усугубляются или не улучшаются, или если возникают другие симптомы, например, повышение температуры, обратитесь к врачу.

Обратитесь к своему врачу, если болезнь возвращается или вы заметили любое изменение течения болезни.

Если вы приняли больше таблеток Септолетотал 3 мг/1 мг, чем необходимо

Если вы случайно приняли слишком большую дозу данного лекарства, немедленно обратитесь к своему врачу или в ближайшую больницу.

Если вы забыли принять таблетки Септолетотал 3 мг/1 мг

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать забытую дозу.

При наличии любых дополнительных вопросов по поводу данного лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные действия

Как и все лекарства, этот препарат может вызвать побочные действия, однако они возникают не у всех лиц.

Редкие (могут возникать у 1 из 1000 лиц)

- реакции повышенной чувствительности,
- крапивница, повышенная чувствительность кожи к солнечным лучам (светочувствительность),
- резкое, неконтролируемое сужение дыхательных путей в легких (бронхоспазм).

Очень редкие (могут возникать у 1 из 10000 лиц)

- Местное раздражение ротовой полости, чувство жжения слизистой оболочки рта.
- **Неизвестной частоты** (не подлежащей оценке по имеющимся данным)
- ожог слизистой оболочки рта, потеря чувствительности слизистой рта (анестезия).

Обычно, эти побочные действия преходящие. Несмотря на это, при их возникновении рекомендуется обратиться к вашему врачу или фармацевту.

При соблюдении указаний, изложенных в данном листке-вкладыше, вы сократите риск возникновения побочных действий.

Сообщение о побочных действиях

При возникновении любых побочных действий, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Они включают любые возможные побочные действия, не указанные в данном листке-вкладыше. Также, вы можете сообщать о побочных действиях непосредственно через национальную систему сообщений, подробности о которой опубликованы на веб-сайте Агентства по лекарствам и медицинским изделиям: www.amed.md или по e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Сообщая о побочных действиях, вы можете способствовать предоставлению дополнительной информации о безопасности данного лекарства.

5. Как хранить таблетки Септолетотал 3 мг/1 мг

Берегите данное лекарство от детей.

Не применяйте данное лекарство по истечении срока годности, указанного на коробке после EXP. Дата истечения срока годности относится к последнему дню соответствующего месяца.

Хранить в заводской упаковке, для защиты от света. Данное лекарство не требует специальных температурных условий хранения. Не выбрасывайте ни одно лекарство во пути следования воды или бытовых отходов. Спросите у фармацевта, как избавиться от лекарств, которые вам больше не нужны. Эти меры помогут охране окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит Септолетотал 3 мг/1 мг в таблетках

Активные вещества - это: бензидамина гидрохлорид и цетилпиридина хлорид.

Каждая таблетка содержит 3 мг бензидамина гидрохлорида и 1 мг цетилпиридина хлорида.

Остальные компоненты - это: масло эвкалипта, левоментол, безводная лимонная кислота, сахароза, изомальт (E953), краситель бриллиантовый голубой FCF (E133).

Как выглядит Септолетотал 3 мг/1 мг в таблетках и содержимое упаковки

Круглые таблетки со скошенными краями и шероховатой поверхностью от светло-голубого до голубого цвета. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Септолетотал 3 мг/1 мг в таблетках выпускается в коробках по 8, 16, 24 или 32 таблетки в блистере. Не все размеры упаковок могут быть в продаже.

Владелец регистрационного свидетельства и изготовитель:

Владелец регистрационного свидетельства

KRKA д.д., Ново место, Шмарьешкацеста 6, 8501, Ново место, Словения.

Изготовитель

KRKA д.д., Ново место, Шмарьешкацеста 6, 8501, Ново место, Словения.

Данный листок-вкладыш пересмотрен в Мае 2016 г.

Подробная информация о данном лекарстве доступна на сайте Агентства по лекарствам и медицинским изделиям <http://nomenclator.amed.md/>.